

쿨프렙산 복용 안내문 및 주의사항

I 쿨프렙산 1차 복용 방법 <검진 전날 시작>

점심약 복용	1차 복용	8시~9시 30분	2차 복용	물	취침전
흰죽 + 알약 ↓ 금식 (물만 가능)	오후 7시~8시 조제 약물 500cc x 2회  1시간	배변 및 휴식 	오후 9시 30분~10시 30분 조제 약물 500cc x 2회  1시간	오후 10시 30분 ~11시 30분 물 500cc x 2회 	엔도콜 

- 1차 복용 - A제(1포)와 B제(1포)를 500mL 통에 넣은 후, 찬물 500mL 표시선까지 채운 다음 흔들어 녹여줍니다. 녹은 용액 500mL를 30분 동안 복용하고 같은 방법으로 500mL 한통 더 복용합니다. (총 1L)
- 1차 복용 후 1시간에서 1시간 30분 정도 휴식합니다. (가벼운 걷기)
- 2차 복용 - ①의 과정을 반복하여 쿨프렙액 1L를 복용합니다.
- 마지막으로 물 1L 추가 복용 (약통으로 2회) 후, 엔도콜 1포를 복용합니다. (이후 금식 유지)

- ▶ **혈압약을 복용하시는 분은 검진 당일 새벽, 물 소량과 같이 복용하십시오.**
- ▶ 심장질환, 뇌질환, 천식, 만성폐질환, 고혈압, 협심증, 당뇨 등으로 현재 복용중인 약물이 있는 경우 담당의사에게 말씀해주십시오.
- ▶ 현재 복용 중인 약물 중 항응고제(쿠마딘)나 항혈전제(아스피린, 플라빅스) 관련 약을 복용하시는 경우, 미리 말씀해주십시오.
- ▶ 검사 당일에는 혈당 조절 약물이나 인슐린주사는 투여하지 마십시오.
- ▶ 대장 정결제 복용이 어려울 수 있으나 장 정결 상태가 불량할 시에는 검사를 제대로 진행하지 못할 수도 있으므로 안내 받으신 대로 모두 복용하셔야 검사가 가능합니다.